

ARRESTO CARDIACO PEDIATRICO

SCUOLA SECONDARIA

MATERIALE DIDATTICO KIDS SAVE LIVES
LICENZA D'USO GRATUITA ESCLUSIVA
©2025 ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL



Italian
Resuscitation
Council

KIDS



SAVE



LIVES

I numeri dell'arresto cardiaco

viva!

55
ogni 100.000



L'arresto cardiaco è un importante problema sanitario; in Europa sono circa 55 le persone ogni 100.000 abitanti colpite da **arresto cardiaco** ogni anno, trattate dal sistema dell'emergenza sanitaria

7,5%



Il tasso di sopravvivenza in Europa è di circa 7,5%

x3



Quando la RCP viene iniziata dai testimoni di un arresto cardiaco, prima dell'arrivo dell'ambulanza, **le possibilità di sopravvivenza raddoppiano o triplicano**. Ciò significa che potremmo salvare 90.000 - 100.000 persone all'anno in Europa, aumentando la percentuale di RCP immediata da parte degli astanti

ILCOR, Cash R, Nehme Z, de Coen A, Perkins G, Devan M, Dicker B, Dassanayake V, Raffay V, Vaillancourt C, Olasveengen T, Tjelmeland L, Kleinman M, Bray J. Impact of different cardiopulmonary strategies on patient outcomes strategies: A systematic review in draft

55.000



In Italia circa 55.000 persone ogni anno sono colpite da **arresto cardiaco**

70%



Il 70% circa degli arresti cardiaci avviene in ambiente domestico e comunque di fronte a dei **testimoni** che potrebbero iniziare la **rianimazione cardiopolmonare (RCP)**

la settimana per la rianimazione cardiopolmonare



Italian
Resuscitation
Council

KIDS  SAVE  LIVES

Che cos'è l'arresto cardiaco?



Ambiente in sicurezza



**Chiamate il bambino ad
alta voce
toccandogli
delicatamente le spalle**



**Se non risponde chiedi aiuto
a un passante e telefonate al
1-1-2 o 1-1-8**



Se non risponde, piegate la testa della vittima all'indietro e sollevate il mento nel bambino e lasciate la testa in posizione neutra nel lattante



Mantenendo le vie aeree aperte valutare se il bambino respira



**Se non risponde e non respira normalmente eseguire
5 ventilazioni di soccorso**



BOCCA-BOCCA



BOCCA-BOCCA E NASO

**SE DURANTE LE VENTILAZIONI NON SONO
COMParsi SEGNI VITALI:**


MOvimenti
TOsse
REspiro



Italian
Resuscitation
Council

KIDS    SAVE    LIVES


Iniziare le compressioni toraciche




Iniziare le compressioni toraciche




Utilizzare e posizionare DAE se disponibile dopo 1 minuto di RCP




MENO DI UN ANNO



PIÙ DI UN ANNO



La Catena della sopravvivenza



Domande?



Italian
Resuscitation
Council

KIDS    SAVE    LIVES

IN BREVE: SOCCORSO PEDIATRICO: SALVA IL RESPIRO

Anche un bambino può avere bisogno d'aiuto.

- Sicurezza: Controlla sempre l'ambiente prima di avvicinarti.
- Stimolo delicato: Se non risponde, chiamalo e toccalo con delicatezza, poi chiama il 1-1-2.
- Posizione della testa:
 - Sotto l'anno: Posizione neutra (allineata).
 - Sopra l'anno: Leggermente estesa all'indietro.
- Se non respira (o lo fa in modo non normale): Inizia con 5 ventilazioni di soccorso.
- Se non reagisce alle ventilazioni: Inizia le compressioni toraciche adattate:
 - Nei lattanti: Con due pollici.
 - Nei bambini più grandi: Con una o due mani.
- Piastre DAE "Panino": Se il torace è molto piccolo, una davanti (sul petto) e una dietro (sulla schiena, tra le scapole).

Ricorda le differenze, ma se non ricordi tutto alla perfezione, fai comunque del tuo meglio. Fare qualcosa è sempre meglio che stare fermi a guardare.

Grazie



Italian
Resuscitation
Council

KIDS    SAVE    LIVES



viva!

la settimana per
la rianimazione
cardiopulmonare

settimanaviva.it



Italian
Resuscitation
Council

KIDS  SAVE  LIVES

Italian Resuscitation Council

♥♥♥.ircouncil.it



Italian
Resuscitation
Council

KIDS 🧒 🧒 🧒 SAVE 🧒 🧒 🧒 LIVES